

## Sheath blight

### MGA SINTOMAS

- ◇ Sa paklang
  - ✓ Bilog-bilog nga daw abuabuhon nga pintok nga dugay nagdako; nga may itom-kaki sa kilid kag may abu-abu sa tunga

Daling mataptan nga parte sa pagtubo:  
pagpanggipi kag pagpamusogbusog

- ◇ Sa dahon
  - ✓ Indi regular ang pilas-pilas, may pagkaabo kag puti sa tunga; nagaputi ang dahon

Daling mataptan nga parte sa pagtubo:  
pagpamusogbusog kag paggulang sang mga dahon

- ◇ Ang balatian kalabanan una maobserbahan sa humayan pagkatapos malab-ot ang pinakataas nga ti-on sang pag panggipi (*maximum tillering*).
- ◇ May mga insidente sa pagtaas sang balatian samtang nagadako nga nagadako ang tanom.
- ◇ Malab-ot 50% ang mapirde sang patubas nga may baridad nga dali malatnan labi na gid kung ang balatian nagadamu sa panahon sang tigtulubo.
- ◇ Ganubo ang patubas tungod sa wala unod nga mga pasi, kag ang pagkapatay sang mga gipi, bug-at sa tinggas, ang kalabaon kag kalidad sa galing apektado.

*Causal organism:* *Rhizoctonia solani* AG1-IA

### PAGDUMALA

1. Sakto nga pagbutang sa nitroheno nga abono
2. Mangin matinlo - paglimpyo sang mga sagbot sa humayan; maayo nga ang pagdaro sa yuta para malubong ang mga uhot kag mga sagbot.
3. Ibulad ang yuta sa init sang adlaw
4. Pahubsan ang humayan sa panahon sa katapusang pagpanggipi (*maximum tillering*)
5. Nubo nga seeding rate kag mas maligwa nga antad sang mga tanum

Source:

Field guide on major disorders of the rice plant in the Philippines. 2002. PhilRice.  
Rice Diseases: Biology and Management (presentation). 2010. PhilRice-IRRI



Impeksyon sa dahon



Impeksyon sa paklang