

Paggamit ng *Trichoderma* sp.



Ang *Trichoderma* sp. ay isang uri ng benepisyal o kaibigang amag (fungus). Ito ay isa sa mga sikat na organismo na ginagamit sa bayolohikong pamamahala ng mga sakit ng halaman dulot ng masasamang amag. Nakatutulong ito upang maiwasan ang mga sakit ng mga halamang gulay tulad ng *tomato stem rot*, *onion bulb rot*, at paltak.

Sa punlaan

- Maghalo ng 15 gramo ng *Trichoderma* sa 16 litrong tubig at i-sprey sa punlaan bago magpatubig o pagkatapos magpatubig.
- Kapag may namamatay na punla, mag i-spray agad ng *Trichoderma* upang mapigilan ang paglala ng sakit.

Sa lipat-tanim

- Maghalo ng 15 gramo ng *Trichoderma* sa 16 litrong tubig.
- Bago itanim ang mga punla sa bukid, isawsaw ang mga ugat sa solusyon ng *Trichoderma* ng 5-10 minuto.
- Kapag may namamatay o nalalantang tanim, mag i-sprey agad ng *Trichoderma*.
- Kapag may maagang senyales ng paltak, maaring gumamit ng *Trichoderma*. Nakatutulong ito sa pagpigil ng pagdami ng sakit.

Ang pag-iisprey ay maaaring gawin bago o pagkatapos magpatubig, magpunla o magsabog-tanim at kapag may namatay na punla