

Paano ang pagbalhin tanum sang humay [Pag-establisar sang tanom]

Ang pagbalhin mahimo sa 21 ka adlaw tapos sabod para sa temprano maggulang nga mga baridad, para sa medyo hinay kag ulihi nga maggulang nga mga baridad. Para sa paghimo sang binhi, ginarekdar sa tanom sang tupong kada raya para makuha ang nagaka-angay nga populasyon sang tanom, para mapadali ang pagbutang sang abuno kag dali ang paghilamon kag pagpanggabot.

1. Itanum ang nagakabagay nga kadamoon nga __. Ang insakto nga kadamoon sang __ nga etisok amo ang 2-3 para malab-ot ang insakto nga populasyon sang tanom para insakto man ang patubas.
2. Itanum ang tanom sa kadalumon nga 2-3 cm, ng dalam nga pagtanum magaresulta sang ulahi kag mahinay nga paggipi.
3. Maggamit sang alambri nga panakos-pagtanum para matanyar ang antad kada tanom. Itanum ang inbred para nga may kaantaron nga 20cm kada luwang kag 20cm kada eras kon tig-ilinit kag ting-ulan.
4. Pagkatapos tanum, magbutang sang rekomendadong pamatay ku-ol kon ang ku-ol seryoso guid nga problema.
5. Maghulip sa indi magkaubos sa pito ka adlaw pagkatapos tanum para palikawan ang pal-ak pal-ak nga paggulang sang tanom. Para sa komersyal nga pagpatubas, dugangan ang kadamoon sang tanom kada eras sang 1 kada isa ka semana nga naulihi sa pagtanum para makompensar ang pagkaiban sang gipi sang mga gulang nga tanom.
6. Ipermamentihon ang lebel sang tubig sa 2-3 cm nga kadalumon pagkatapos tanum.



(Source: *Field Operations Manual, PhilRice, 2007*)

Reviewed by:
Rolando C. San Gabriel