

Papaya Fruit Fly

Sintomas: Paninilaw at Pagkabulok ng Prutas

Pamamahala:

- Isupot ang mga bunga bago mahinog upang maiwasan ang pangangitlog ng Fruit Fly sa bunga.
- Kagyat na anihin ang mga hinog na bunga.
- Itapon ng maayos ang mga papayang mayroong sakit/peste.
- Gumamit ng mga *attractants* gaya ng methyl eugenol upang sugpuin ang populasyon ng mga lalaking fruitfly.
- Kinakailangan ang paglalagay ng insecticides tulad ng dimethoate, fenthion at diazinon ay nasa tamang oras.



Aphids



Sintomas: Paninilaw ng mga dahon at pagkalanta o pagkaluoy ng halaman.

Ang Aphids ang nagdadala ng Papaya Ring Spot Virus

Pamamahala:

- Maglagay ng Cartap Hydrochloride, Malathion, at Thiametoxian sa tamang panahon.

Para sa karagdagang impormasyon, sumulat, bumisita, o tumawag sa:
 NUEVA ECIIJA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER
 CLSU Compound, Science City of Muñoz, 3119
 Nueva Ecija / 0916-508-3569

Inilimbag na may pahintulot ng NUEVA ECIIJA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER