

For more information, please call/text us at: **0920-911-1398** or visit:
www.philrice.gov.ph | www.pinoyrice.com

Sitaw

Ang sitaw ay nabibilang sa mga gulay na tinatawag na legumbre. Maaaring kainin ang talbos at bunga nito. Nagtataglay ito ng protina, *carbohydrates*, calcium, bitamina A at iba pang mineral.

Para sa mas magandang ani, itanim ito sa mga buwan ng Mayo hanggang Hunyo kung tag-ulan at sa mga buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre kung tag-araw.

PAGPILI AT PAGHAHANDA NG LUPANG TANIMAN

Mainam na magtanim sa lupang tinatawag na lagkitang galas o malasutlang lagkitang galas na may asim na 5.5 hanggang 6.8 at madaling patuyuan.



Araruhin at suyurin ang lupa nang 2 hanggang 3 beses hanggang sa maging pino ang lupa.

PAGTATANIM

Gumawa ng tudling na may layong 1 metro sa pagitan ng mga hanay at 50 sentimetrong pagitan ng mga butas. Maglagay ng 2 hanggang 3 buto sa bawat butas sa lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Ang 1 ektarya ay nangangailangan ng 10 kilo ng buto.

PAGPAPATABA

Uri ng Pataba	Dami ng Pataba (kada ektarya)	Panahon ng Pagpapataba	Paraan ng Pagpapataba
14-14-14	4 sako	10 araw pagkatanim	Ilagay sa bawat butas
21-0-0	2 sako	25 araw pagkatanim	Ilagay sa bawat butas
KNO3	10 kg	40 araw pagkatanim	Ilagay sa bawat butas
0-0-60	1 sako		

PAGPAPATUBIG

Magpatubig pagkatapos magtanim at minsan sa isang linggo hanggang sa paglaki nito.

PAG-AALIP-IP (*MULCHING*)

Ginagawa ang pag-aalip-ip upang mapanatiling basa ang lupa at makontrol ang pagdami ng damo. Gumamit ng dayami, ipa, o *polyethylene plastic mulch*.

PAGKONTROL NG DAMO

Damuhan ang lupang tinaniman. Maaari ring gumamit ng mga makinang pambubungkal ng lupa 2 linggo pagkatapos magtanim. Magsablay o araruhin palabas ng puno 3 hanggang 4 na linggo pagkatanim.



PAGGAWA NG BALAG

Maaaring gawin ang pagbabalag bago o pagkatapos magtanim. Ginagawa ito upang mas maparami ang ani. Maglagay ng bukawe o buho sa mga tudling na may pagitang 2 hanggang 3 metro. Maglagay pahalang ng *G.I wire* sa taas, gitna at babang bahagi ng buho. Magtali ng leteng sa pagitan ng mga buho na may layong 20 sentimetro.



IBA PANG PAMAMARAAN NG PAGKONTROL

- Magtanim ng halamang nakakapagbugaw ng mapaminsalang insekto gaya ng marigold at chichirica.
- Gumamit ng insect trap (*yellow sticky trap*).
- Alisin agad ang napinsalang halaman at sunugin.
- Panatilihin malinis ang lugar na pinagtamnan.

PAG-AANI

Maaari nang anihin ang sitaw kapag ang mga buto nito ay kasukat na ng kalahati ng lapad ng lapis at madaling maputol kapag binaluktot. Maglaktaw ng 3 hanggang 4 na araw bago anihing muli ang natitira pang bunga.



Para sa karagdagang impormasyon, sumulat, bumisita, o tumawag:
NUEVA ECIJA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER
CLSU Compound, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
0916-508-3569

Inilimbag na may pahintulot ng NUEVA ECIJA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER