

For more information, please call/text us at: **0920-911-1398** or visit:
www.philrice.gov.ph | www.pinoyrice.com

Upo

Ang gulay na ito ay mayaman sa *carbohydrates*. Ang buto nito ay maaaring mapagkunan ng langis na panggamit sa buhok.

PAGPILI NG LUPANG TANIMAN

Ang upo ay nangangailangan ng lupang tinatawag na buhanginang galas na may sapat na mapagkukunan ng tubig at may asim (pH) na 5.5 hanggang 6.5. Iwasang magtanim sa mga lugar na may mataas na *acidity*, *alkalinity* o *salinity*. Malaki ang epekto ng hindi magandang lupa sa produksyon ng babaeng bulaklak ng tanim.

PANAHOON NG PAGTATANIM

Maaaring itanim ang upo sa anumang uri ng klima. Gayunpaman, ang malakas na pag-ulan ay hindi makabubuti sa tanim. Ang temperaturang kailangan ng upo ay 30°C hanggang 35°C. Kapag ang temperatura ay masyadong mataas, mas maraming bulaklak na lalaki ang mabubuo na nagdudulot ng mababang ani at kita. Para sa mas masaganang ani, magtanim sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre o mula Mayo hanggang Hulyo.

PAGHAHANDA NG LUPANG TANIMAN

Linisin, araruhin at suyurin nang dalawang beses ang lupang tatamnan. Gumawa ng tudling na may layong 3 metro at butas ng mga tudling na may layong 1 metro.

PARAAN NG PAGTATANIM

Ang upo ay maaaring itanim nang direktang buto (*direct seeded*) o punla (*transplanted*). Ang distansya ng pagtatanim ay 3 metro x 10 metro. Sa panahon ng tag-ulan, itanim ito sa bandang ibabaw ng tudling at sa bandang ibaba naman ng tudling sa panahon ng tag-araw. Maglagay ng dalawang buto sa bawat butas. Bunutin ang mga payat na punla 7 araw pagkatapos umusbong. Magtira lamang ng isang tanim sa bawat butas.



PAGKONTROL NG DAMO

Magdamo 14 na araw pagkatapos magtanim at magsablay o araruhin palabas ng puno isang buwan pagkatanim kapag hindi naalip-ipan.



PAGPAPATABA

Uri ng Pataba	Dami ng Pataba (kada ektarya)	Panahon ng Pagpapataba	Paraan ng Pagpapataba
14-14-14	2 sako	Sa pagtatanim	Basal
46-0-0	2 sako	30 araw pagkatanim	Ilagay sa bawat butas
46-0-0 + 0-0-60 (2:1)	2 sako +1 sako	45 araw pagkatanim	Ilagay sa bawat butas

PAGPAPATUBIG

Patubigan ang tanim 14 na araw pagkatubo sa pamamagitan ng *flooding*. Ulitin ang pagpapatubig tuwing ikapitong araw sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at kung kinakailangan lamang sa mga buwan ng Mayo hanggang Hulyo.

PAGKONTROL NG MGA INSEKTO AT SAKIT

Insekto	Kontrol
Leaf folders	Methomyl
Yellow squash beetle	Deltamethrin

Sakit	Kontrol
Anthravnose	Captan

PAG-AANI

Maaari nang anihin ang bunga 50 hanggang 60 araw pagkatanim. Mainam na gumamit ng kutsilyo sa pamimitas ng bunga upang mahiwa ang tangkay 5 sentimetro mula sa dulo ng bunga.



Para sa karagdagang impormasyon, sumulat, bumisita, o tumawag:
 NUEVA ECIIA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER
 CLSU Compound, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
 0916-508-3569

Inilimbag na may pahintulot ng NUEVA ECIIA FRUITS & VEGETABLES SEED CENTER